

"DIOD" ARTRO-ACTIVE tabletid N20

SKU: V00000012058

Stock Qty:



Product Description

Koostis

1 tablett massiga 500 mg sisaldab:

- glükoosamiinsulfaati,
- kondroitiinsulfaati,
- kollageeni hüdroolüsaati,
- kuiva suitsukese puuvaiku ekstrakti;

Abiained:

- mikrokristalliline tselluloos,
- loodusliku "Kreem" lõhna- ja maitseaine,
- kaltsiumstearaat.

Farmakoloogiline toime

Farmakoterapia rühm:

Toetusliigutussüsteemi funktsioonide toetamiseks mõeldud toidulisandid

Farmakoterapiline toime:

Tablette Arthro-Active liigese toitainetena soovitatakse glükoosamiinsulfaadi, kondroitiinsulfaadi allikana, mis soodustavad:

Liigeshõlma toitumise paranemist.

Sünoviaalvedeliku tootmise ja koostise parandamist, liigese määrimise parandamist.

Liigesehõlma taastumisprotsesside kiirendamist, kõhre hävimise ennetamist.

Mõõdukat põletikuvastast toimet.

Mõjutatud liigeste liikuvuse ja funktsioonide paranemist.

Koostisosad:

Kuiva suitsukese puuvaigu ekstrakt:

Takistab rakkude faktorite tööd, mis vastutavad põletikku soodustavate ainete tekkimise eest.

Põhilised kondroprotektorid (kondroitiinsulfaat, glükoosamiinsulfaat).

Soodustavad liigese kõhre pindade taastumist: suurendavad kondrotsüütide "ehituslikku" aktiivsust, parandavad sünoviaalvedeliku koostist ja määrimisomadusi.

Kollageeni hüdroolüsaat tagab liigese kõhre tugevuse ja elastsuse.

Näidustused

Soovitav toidulisandina - täiendava glükoosamiini ja kondroitiini allikana.

Kasutatakse järgmiste puhul:

- Osteoartroos, osteokondroos.
- Liigeste vigastused ja posttraumaatiline periood.
- Liigeste deformatsioon (nihestused, anküloosid).
- Suurenenud funktsionaalne koormus liigestele (ülekaal, füüsiline koormus).
- Eakate ja traumaatiliste degeneratiivsete-düstroofsete liigesehaiguste ennetamiseks.

Vastunäidustused

Isiklik talumatus toidulisandi komponentide suhtes, rasedus, imetamine.

Kõrvaltoimed

Allergilised reaktsioonid.

Kuidas võtta, kuuri kestus ja annustamine

Täiskasvanutele 2 tabletti 2 korda päevas söögi ajal, veega maha pestuna (1. nädal), seejärel 1 tablett 2 korda päevas söögi ajal, veega maha pestuna (2-5 nädalat). Ravi kestus - 5 nädalat.

Erijuhised

Enne kasutamist on soovitatav konsulteerida arstiga.

Väljalaskevorm

tabletid

Säilitamistingimused

Hoida kuivas kohas temperatuuril mitte üle +25 ° C.

Product Specification