

BOORPIIRITUS 2% 20ML TERNOFARM

SKU: V100000012341

Stock Qty:



Product Description

Farmakoteraapiline rühm.

Antiseptikumid ja desinfektsioonivahendid.

Ravimil on antiseptiline toime. See koaguleerib mikroobiraku valke (sh ensüüme), häirib rakumembraani läbitavust, mille tulemusena peatub bakterite kasv ja areng.

Väliste kasutusviiside korral imendub ravim kahjustatud nahast, haavapinnalt; juhuslikul allaneelamisel imendub läbi seedetrakti limaskestast. Boorhape võib koguneda organismi kudedesse. Eritub organismist aeglaselt.

Kasutamisanõudused

Püoderma, niiske ekseem, mähkmeööve, äge ja krooniline keskkõrvapõletik

Vastunäidustused

Suurenenud tundlikkus boorhappe suhtes, neerufunktsiooni häire, krooniline mesotimpaniit normaalse või vähese muutusega limaskestaga, traumaatilised trummikile perforatsioonid; rasedus või imetamise periood, rinnanäärmete töötlemine, lastele (sh vastsündinutele).

Turvalisusbabinõud kasutamisel

Ärge kandke ravimit suurtele nahapiirkondadele, ärge kasutage õõnsuste loputamiseks. Vältige silma sattumist.

Erijuhised

Kasutamine raseduse või imetamise perioodil.

Ravim on vastunäidustatud naistele raseduse või imetamise ajal.

Võime mõjutada reaktsioonikiirust sõidukijuhtimisel või muude masinatega töötamisel.

Ei mõjuta.

Lapsed.

Ravim on lastele vastunäidustatud.

Kasutusviis ja annused

Kasutamine välispidiselt.

Püoderma, mähkmeööbe, ekseemi korral töödelge ravimiga niisutatud salvrätikuga kahjustatud nahapiirkondi 2-3 korda päevas.

Keskkõrvapõletiku korral sisestage kuulmekäiku ravimiga niisutatud tampoonid või tilgutage 2-3 korda päevas 3-5 tilka.

Üleannustamine

Juhusliku allaneelamise korral loputage magu sondiga, määrake soolalahused, enterosorbendid (aktiivsüsi), sümptomaatiline ravi.

Ägeda mürgistuse sümptomid: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, vereringe ja kesknärvisüsteemi pärssimine, kehatemperatuuri langus, šokk, kooma, erüteemne lööve. Raske mürgistuse korral võtke meetmeid elutähtsate kehafunktsioonide toetamiseks, viige läbi hemodialüüs või peritoneaaldialüüs, tehke vereasendusravi. Pikaajalise ravimi kasutamise korral suurteil nahapiirkondadel võivad tekkida kroonilise joobeseisundi sümptomid: kudede turse, kurnatus, stomatiit, ekseem, naistel menstruaaltsükli häired, aneemia, krampid, alopeetsia. Sel juhul tuleb ravim katkestada ja läbi viia sümptomaatiline ravi.

Kõrvaltoimed

Ravimi kasutamine võib põhjustada allergilisi reaktsioone (naha punetus, sügelus, urtikaaria, lööve, turse).

Harvadel juhtudel võib tekkida anafülaktiline reaktsioon, sealhulgas šokk, epiteeli desquamatsioon.

Mõnel patsiendil, eriti pikaajalise kasutamise korral, võivad tekkida iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, peavalu, teadvuse segasus, oliguuria. Neerufunktsiooni häiretega patsientidel võivad tekkida krampid.

Iga soovimatu sündmuse ilmnemisel pöörduge arsti poole!

Koostoime teiste ravimitega ja muud tüüpi koostoimed.

Koostoime on seni teadmata.

Iga teise ravimi samaaegsel kasutamisel teavitage sellest arsti.

Säilivusaeg.

3 aastat.

Säilitamistingimused.

Hoida temperatuuril mitte üle 25 °C.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Pakend.

10 ml viaalides või 20 ml tilgutipudelites.

Vältige silma sattumist. Silma sattumisel loputage hoolikalt veega. Hoida temperatuuril +5°C kuni +25°C, kuivas, pimedas kohas, lastele kättesaamatus kohas. Säilivusaeg: vt pakendilt. Tootja: Ternofarm, Ukraina. Importija: VITATEKA OÜ, Mõisa tee 5, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa, Eesti 74204 www.vitateka.ee.

Product Specification