

# NEOLEXAN TABLETID N30



SKU: V100000004657

Stock Qty:



## Product Description

Неолексан (Neolexan) назначают при пониженном уровне серотонина в клетках мозга, а также лицам, садящимся на диету и/или отказывающихся от таких вредных привычек, как курение, злоупотребление спиртными напитками и т.д.

### ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА 5-ГИДРОКСИТРИПТОФАН (5-НТР)

Вещество 5-гидрокситриптофан (5-НТР) образуется в человеческом организме из триптофана - незаменимой аминокислоты, поступающей в организм вместе с пищей. В тканях мозга 5-гидрокситриптофан превращается в серотонин - вещество, передающее нервные импульсы от клеток мозга. Серотонин известен также как „гормон счастья“.

Дополнительный прием 5-гидрокситриптофана в виде таблеток повышает уровень серотонина в тканях мозга и таким образом эффективно воздействует на клетки при состояниях, связанных с низким уровнем содержания серотонина, не вызывая при этом побочных эффектов в отличие от других назначаемых в таких случаях лекарственных средств.

### КОМУ НАЗНАЧАЮТ НЕОЛЕКСАН (NEOLEXAN)

Неолексан (Neolexan) назначают при пониженном уровне серотонина в клетках мозга, а также лицам, садящимся на диету и/или отказывающихся от таких вредных привычек, как курение, злоупотребление спиртными напитками и т.д.

### КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ ВРАЧУ ДО ПРИЕМА ПРЕПАРАТА НЕОЛЕКСАН (NEOLEXAN)

#### Информируйте вашего врача, если:

Находитесь одном из следующих состояний:

Гепатальная недостаточность

Почекная недостаточность

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки

Нарушение свертываемости крови

Кормление грудью

Синдром Дауна

#### Принимаете некоторые из следующих медикаментов:

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (SSRI) типа citalopram (Seropram), escitalopram (Cipralex), fluvoxamine (Feverin), fluoxetine (Prozac), paroxetine (Seroxat, Paroxat) или sertraline (Zoloft);

Ингибиторыmonoаминооксидазы (MAOI) типа tranylcypromine (Nardil), phenelzine (Parnate) или isocarboxazid (Marplan)

Трициклические антидепрессанты типа amitriptyline (Elavil), amoxapine (Asendin), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil) или trimipramine (Surmontil);

Медикаменты против СПИда

### ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА НЕОЛЕКСАН (NEOLEXAN)

В начале приема у некоторых пациентов возможно появление рвотных симптомов, снять которые можно, начиная прием препарата с низких доз неолексана (Neolexan) с постепенным увеличением дозы, при необходимости.

### КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ НЕОЛЕКСАН (NEOLEXAN)

Беременным женщинам

Детям до 12-летнего возраста.

### КАК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ НЕОЛЕКСАН (NEOLEXAN)

При бессоннице рекомендуют от 1 до 6 таблеток однократно за 30-45 минут до сна. Ввиду того, что некоторые пациенты могут почувствовать слабую рвоту после первого приема препарата неолексан (Neolexan), рекомендуется начинать с 1 таблетки до сна с постепенным увеличением дозы при необходимости.

При приеме препарата неолексан (Neolexan) во время диеты с целью похудения рекомендуют по 1 таблетке за 20 минут до еды.

Не прекращайте принимать препарат после того, как почувствуете себя лучше, без консультации с вашим врачом.

Приведенная информация является ознакомительной и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата. Любая информация, представленная на сайте, не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Product Specification  
Lisainfo

**Основное действие**

Общеукрепляющего действия | Для иммунитета