

# Релакседин №30

SKU: V00000006671

**Stock Qty: 0**



## Product Description

### Состав на одну капсулу

Валерианы водно-спиртового экстракта сухого стандартизованного (0,5 – 0,8% или 0,8% валереновых кислот) в пересчете на сумму валереновой и ацетоксивалереновой кислот – 0,582 мг, Melissa листьев водно-спиртового экстракта сухого стандартизованного (4-7% розмариновой кислоты) в пересчете на розмариновую кислоту – 2 мг. В упаковке 30 капсул.

### Фармакодинамика

Лекарственное средство Релакседин содержит комбинацию сухих экстрактов корня валерианы и листьев Melissa.

Опыт традиционного применения показал, что экстракты корня валерианы и листьев Melissa обладают седативным действием, облегчают наступление сна и улучшают качество сна.

Указанные эффекты нельзя объяснить действием какого-либо одного компонента экстрактов корня валерианы или листьев Melissa. Некоторые механизмы действия, которые вызывают данные клинические эффекты, были определены для различных компонентов корня валерианы (сесквитерпеноиды, лигнаны, флавоноиды) и включают в себя влияние на ГАМК-систему, A1 аденозиновые рецепторы и 5-HT1A рецепторы. Седативный эффект при использовании препаратов валерианы проявляется медленно, но достаточно стабильно и полностью развивается только при систематическом курсовом лечении.

### Фармакокинетика

Фармакокинетические параметры не изучены, так как лекарственные средства растительного происхождения содержат различные биологически активные вещества.

### Показания к применению

Лекарственное средство Релакседин применяют в комплексной терапии нетяжелых функциональных нарушений центральной нервной системы (неврастения и нарушения сна).

### Инструкция по применению

Релакседин инструкция по применению.

Релакседин по инструкции по применению назначается взрослым и детям старше 12 лет.

При повышенной нервной возбудимости, раздражительности принимают по 2 капсулы 2 раза в день.

При нарушениях сна рекомендован прием 1 капсулы за полчаса – 1 час перед сном.

Капсулы следует принимать, запивая небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры (1/4 стакана), независимо от приема пищи.

Эффект от приема лекарственного средства Релакседин развивается постепенно. Для достижения оптимального эффекта рекомендуется прием лекарственного средства в течение не менее 14 дней. После прекращения лечения не происходит развитие симптомов зависимости или синдрома отмены.

Длительность приема определяется индивидуально с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

### Особые указания

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 12 лет не рекомендуется.

Из-за постепенного развития эффекта лекарственное средство не рекомендовано применять в случаях экстренной необходимости уменьшения симптомов психического возбуждения и нарушений сна. Если симптомы сохраняются на фоне приема лекарственного средства или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

### Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
- беременность и период лактации;
- детский возраст до 12 лет;
- артериальная гипотензия.

## Product Specification

Lisainfo

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Peamine toime | Närvisüsteemi normaalse toimimise toetamine |
| Tootmisriik   | Läti                                        |
| Pikkus        | 0.000000                                    |
| Kõrgus        | 0.000000                                    |
| Laius         | 0.000000                                    |