

"MISHKI EVALAR"

Närimispastillid Rahulikkus N30



SKU: V00000012701

Stock Qty:



Product Description

Farmakoloogiline toime

Ärritus, impulsiivsus, hajameelsus, õppimisvõime langus - need on tüüpilised hüperaktiivsuse ilmingud lapse puhul, millele vanemad peaksid tähelepanu pöörama.

Spetsiaalselt nendele lastele alates 3. eluaastast on välja töötatud närimiskommid Baby Formula rahulikkuseks, mis on kujundatud karu kujul.

Kompleksi hoolikalt valitud komponendid:

glütsiin, piparmündi- ja melissiekstraktid, magneesium, vitamiin B6 - avaldavad normaliseerivat toimet ärrituse ja pidurdumise protsessidele kesknärvisüsteemis, soodustavad vaimse võimekuse suurenemist, ärrituvuse vähenemist ja vegetatiivsete reaktsioonide normaliseerumist ning aitavad normaliseerida öist und.

Toimeained

Glütsiin vähendab ärevust, leevendab stressi, stimuleerib vaimset tegevust, kõrvaldab agressiooni, normaliseerib und, ennetab ajuprobleeme ja vegetatiivseid-vaskulaarseid häireid.

Magneesium. Ekspertide sõnul on magneesiumil laste organismi tervise seisukohalt põhiroll.

Arvestades, et see mikroelement on sadade ensüümide komponent, mõjutab ta igat füsioloogilist protsessi, mis toimub organismis.

Üks magneesiumi olulistest toimetest organismis on stressivastane toime.

Makroelemendi puudumisel ilmnevad lastel sotsiaalse kohanemise probleemid ja käitumishäired - ärritus, ärevus, nuttlikkus, samuti unehäired - unetus, öised õudusunenäod koos rikkaliku higistamisega, uinumisraskused.

Melissi ja piparmündi ekstraktid. Neil on rahustav, lõõgastav ja rahustav toime organismile.

Spetsialistid soovivad anda neid hüperaktiivsetele lastele, kes ei suuda keskenduda - taimed parandavad mälu, keskendumisvõimet ja kontsentratsioonivõimet.

Koostis

Komponent Sisaldus 1 kommis

Glütsiin 50,0 mg

Piparmündiekstrakt 15,0 mg

Melissi ekstrakt 15,0 mg

Magneesium, mitte vähem kui 5,0 mg

Vitamiin B6, mitte vähem kui 0,5 mg

Vastunäidustused

Individaalne talumatus komponentide suhtes, süsivesikute ainevahetuse häired.

Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida lastearstiga.

Kuidas võtta, ravi kestus ja annustamine

Lastele vanuses 3 kuni 7 aastat - 1 närimiskomm päevas koos toiduga.

Lastele vanuses üle 7 aasta - 1 närimiskomm 2 korda päevas koos toiduga.

Ravi kestus - 1-2 kuud. Vajadusel võib ravi korrata.

Product Specification

Lisainfo

Основное действие

Успокоительного действия